

SERESTO COLLIER PETITS CHIENS, SERESTO COLLIER GRANDS CHIENS collier. **Espèces de destination** : Chien. **Indications** : Traitement (*Ctenocephalides felis*) et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis* et *Ctenocephalides canis*) pendant 7 à 8 mois. Le médicament protège l'environnement immédiat de l'animal contre le développement de larves de puces pendant 8 mois. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Le produit exerce une action acaricide (létale) (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) et une action répulsive (empêchant les parasites de se nourrir) contre les infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) durant 8 mois. Il est efficace contre les larves, les nymphes et les tiques adultes. Les tiques déjà présentes sur le chien avant le traitement peuvent ne pas être tuées dans les 48 heures après l'application du collier, et rester fixées et visibles. Par conséquent, il est recommandé d'enlever les tiques déjà présentes sur le chien au moment de l'application. La prévention contre les infestations par de nouvelles tiques commence dans les deux jours après l'application du collier. Le produit permet une protection indirecte contre la transmission de *Babesia canis vogeli* et d'*Ehrlichia canis* à partir du vecteur *Rhipicephalus sanguineus*, conduisant ainsi à réduire le risque de babésiose canine et d'ehrlichiose canine pendant 7 mois. Traitement de l'infestation par les poux broyeurs (*Trichodectes canis*). Idéalement, le collier devrait être appliqué avant le début de la saison des puces et tiques. **Contre-indications** : Ne pas traiter les chiots âgés de moins de 7 semaines. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux substances actives ou à l'un des excipients. **Précautions particulières d'emploi : Pour l'utilisateur** : Conserver le sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu'à son utilisation. Comme pour tout médicament vétérinaire, ne pas autoriser les jeunes enfants à jouer avec le collier ni à le mettre dans leur bouche. Les animaux portant le collier ne doivent pas être autorisés à dormir dans le même lit que leurs propriétaires, surtout les enfants. Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux ingrédients du collier devront éviter tout contact direct avec celui-ci. Eliminer immédiatement tous restes ou chutes du collier. Se laver les mains à l'eau froide après la mise en place du collier. **SERESTO est un médicament vétérinaire. Lisez attentivement la notice et les indications de l'emballage avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire/pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre vétérinaire.** Bayer HealthCare - 220, avenue de la Recherche 59120 Loos - SAS au capital de 47.857.291,14 € - RCS Lille Métropole 706 580 149. VGP 09/2017